

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|--|
| D4 ENTERPRISE SOLUTIONS | Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. | | | Niveau: Proces |  |
| | Procedure for Blødning ante/intra partum | | | | |
| Dokumentnummer: P4.2.01 | Redaktør: JuIMol | Dokumentansvarlig: KlinikChef | Version: 1 | Godkendt af: LouZie | 22.10.2014 |
| Dokumentbrugere: JDM | | | | | |

Formål

At indentificere patologisk blødning, defineret som mere end tegnblødning

Anvendelsesområde

Proceduren anvendes på Fødeklinik Storkereden.

Fremgangsmåde

Definition:

Blødning mere end tegnblødning

Fremgangsmåde ved blødning antepartum:

Hvis patienten henvender sig telefonisk antepartum, og blødning skønnes større end tegnblødning, henvises patienten direkte til det tilknyttede fødested. Den vagthavende jordemoder kontakter den pågældende fødegang og undersøger om ultralydsscanning har udelukket placenta prævia.

Ved mistanke om placenta prævia, undlades vaginal eksploration hvis patienten er tilstede på klinikken.

Blødning intrapartum:

Ved blødning intrapartum der skønnes mere end tegnblødning overflyttes akut til Næstved fødeafdeling. (Husk overflytningstaske) (se procedure for overflytning)

Blødningskasse hentes (Indeholdende venflons, staseslange, plaster, blodtryksapparat engangskatetre, NaCl isot 500 ml, Syntocinon 10 IE/ml, Methergin 0,2mg/ml, tbl. Cytotec 0,2 mg) Inden og under overflytningen observeres der BT og puls og der lyttes hjertelyd hvert 5 min. Intra-venøs adgang sikres med to store i.v. kanyler. Der opsættes intravernøs NaCl og der gives ilt 5 l./minuttet.

Der vurderes løbende: Tonus i uterus og blødningsmængde (blødningsmængden måles, skønnes ikke) og evt lejeændring. Fødegangen og ansvarshavende obstetriker holdes løbende orienteret. Ved hyperten uterus og evt påvirket hjertelyd kan hsp overvejes.

Ansvarsforhold

Det er klinikejeren der er ansvarlig for implementeringen af proceduren. Det er den enkelte medarbejder der har ansvaret for udførelsen af proceduren. Klinikejer har ansvar for at ajourføre vejledningen i tilfælde af ny viden eller evidens indefor området.

Dokumentation

Observationer, tiltag og behandlinger noteres af jordemoderen i fødejournalen, efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer, samt Vejledning om jordemødres pligt til at føre ordnede optegnelser.

Referencer

Region Sjællands retningslinjer for blødning ante/intrapartum

Bilag:

1, Blødning ante/intra partum